

**BLESSURES FONDAMENTALES: VÉSICULE À BULLE**

Waleska Christiane Albuquerque dos SANTOS¹; Gil Dutra FURTADO²; Magnolia Ouriques de OLIVEIRA³

¹Graduando em Odontologia/Centro Universitário Maurício de Nassau, João Pessoa (UNINASSAU/PB). E-mail: waleska.chrystiane@hotmail.com

²Graduando em Medicina Veterinária/UNINASSAU/PB; Engenheiro Agrônomo/Universidade Federal da Paraíba (UFPB); Doutor em Psicobiologia/Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN); Agrônomo-Sócio da Cooperativa de Agronegócio (COOPAGRO). E-mail: gdfurtado@hotmail.com

³Cadre Medico Educatif, Educatrice Spécialisée, Monitrice Educatrice, Aide Medico Psychologique/Institut Régional du Travail Social, Poitiers, France (IRTS). E-mail: ouriques@hotmail.fr

Résumé. Les processus pathologiques de base apparaissent cliniquement, en raison de modifications morphologiques variées, de la peau ou des muqueuses buccales, et sont appelés lésions fondamentales ou élémentaires, où se trouvent des lésions de vésicules vésiculaires, objet de l'étude de ce travail. Grâce à la méthodologie de la revue bibliographique, il a été possible de déterminer les détails inhérents à cette lésion fondamentale. Les lésions des vésicules blister ont comme caractéristique fondamentale la formation de cloques ou de vésicules dans la cavité buccale, et la connaissance précise de cette lésion revêt une importance considérable, car les hypothèses de diagnostic sont formulées à la suite d'un tableau clinique observé chez le patient et fondé sur dans l'histoire clinique de la maladie et les caractéristiques cliniques de la lésion produite. Il est conclu que la vésicule vésiculeuse peut être le résultat d'une blessure pouvant survenir chez l'homme, en général.

Mots-clés: Bulles; Pathologie; Vésicule.

LESÕES FUNDAMENTAIS: VESÍCULA BOLHA

Os processos patológicos básicos aparecem clinicamente, por variadas alterações morfológicas, na pele ou mucosa bucal, e são denominadas lesões fundamentais ou elementares, onde se encontram as lesões vesícula bolha, objeto de estudo neste trabalho. Mediante a metodologia de revisão bibliográfica, foi possível averiguar os detalhes inerentes desta lesão fundamental. A lesões vesícula bolha tem como característica fundamental a formação de bolhas ou vesículas na cavidade oral, e o conhecimento acurado sobre esta lesão assume considerável importância, uma vez que as hipóteses diagnósticas são formuladas em decorrência de um quadro clínico observado no paciente e que se fundamenta na história clínica da doença e características clínicas da lesão produzida. Conclui-se que a vesícula bolha pode ser o resultado de uma lesão que pode ocorrer nos seres humanos, de forma geral.

Palavras-chave: Bolhas; Patologia; Vesícula.

FUNDAMENTAL INJURIES: BUBBLE VESICLE

The basic pathological processes appear clinically, due to various morphological alterations, in the skin or buccal mucosa, and are called attention operations or elementary, where the vesicles of bubbles are found, object of study in this work. Through a bibliographic review methodology, it was possible to investigate the inherent details of this fundamental lesion. The bubble vesicle discussion has as fundamental characteristic the formation of commas and vesicles in the oral cavity, and the knowledge about the assumed lesion is only a matter of importance, as the diagnostic hypotheses are based on this question. clinical history of the disease and disease. You can make a blister to be the result of an injury that can occur in humans in general.

Keywords: Bubbles; Pathology; Vesicle.

LESIONES FUNDAMENTALES: VEJIGA BURBUJA

Los procesos patológicos básicos aparecen clínicamente, por variadas alteraciones morfológicas, en la piel o mucosa bucal, y se denominan operaciones de atención o elementales, donde se encuentran las vesículas de burbujas, objeto de estudio en este trabajo. Mediante una metodología de revisión bibliográfica, fue posible averiguar los detalles inherentes de esta lesión fundamental. La discusión vesícula burbuja tiene como característica fundamental la formación de comas y vesículas en la cavidad oral, y el conocimiento sobre la lesión asumida es sólo una cuestión de importancia, como las hipótesis diagnósticas se fundamentan sobre esta cuestión. historia clínica de la enfermedad y de la enfermedad. Usted puede hacer una vesícula a ser el resultado de una lesión que puede ocurrir en los seres humanos, de forma general.

Palabras clave: Burbujas; Patología; Vejiga.

INTRODUCTION

Les processus pathologiques considérés comme fondamentaux, provoqués par plusieurs modifications morphologiques, apparaissent cliniquement dans la muqueuse buccale et / ou dans la peau, où ils sont connus et nommés comme lésions fondamentales (ou lésions élémentaires). En portant une attention particulière aux occurrences dans la muqueuse buccale, nous verrons quelle est la vésicule à bulles. Ses connaissances précises revêtent une importance considérable pour le diagnostic, car les hypothèses du diagnostic formulé, dû à un cadre observé, sont basées sur l'historique clinique de la maladie et caractéristiques cliniques de la lésion produite (DANIEL; BANDEIRA; BRANDÃO, 2017).

Une stomatite, tout processus inflammatoire qui affecte la cavité buccale et l'oropharynx, est une lésion inflammatoire pouvant avoir différentes étiologies, telles que

réactions infectieuses, auto-immunes, traumatiques, néoplasiques ou médicamenteuses, entre autres, et ces lésions peuvent être classées selon l'aspect macroscopique (SILVA; LANDMAN; BUSSOLOTI FILHO, 2002). La stomatite ou les lésions qui affectent la cavité buccale peuvent se manifester de plusieurs manières, mais il est toujours possible de trouver dans chaque lésion une caractéristique fondamentale qui prédomine et qui peut être résumée dans:

- Présence de taches (blanches, rouges ou sombres);
- Formation de cloques ou de vésicules;
- Présence de nodules ou de masses tumorales;
- Présence d'ulcérations;
- Formation de cicatrices.

Les éléments fondamentaux sont importants dans la classification de la stomatite, car il existe plusieurs classifications possibles. Nous présentons donc ci-dessous une classification basée à la fois sur les caractéristiques fondamentales et sur l'étiologie des pathologies affectant la cavité buccale (ROEST et al., 2003).

Lésions blanches (caractéristique fondamentale de la lésion est sa couleur blanchâtre); Lésions vésico-bulleuses (prédominance de la formation de cloques, de vésicules et, après leur rupture, d'ulcérations de la muqueuse); Lésions atoïdes (les lésions ressemblent à des aphtes communs); et Blessures associées à des maladies systémiques ou infectieuses.

BLESSURES BLANCHISSANTES PAR LA VÉSICULE

Ce sont des groupes de lésions dont la caractéristique fondamentale est la formation de vésicules ou de bulles dans la cavité buccale. Il s'agit d'une croissance superficielle, remplie de liquide, où vésicule ce terme est utilisé pour désigner une lésion allant jusqu'à 3 mm, et d'une cloque pour une lésion de plus de 3 mm de diamètre. Ils peuvent initialement se manifester par des vésicules (herpès) et d'autres par des vésicules (pemphigus vulgaris), qui se rompent par la suite en laissant un lit érosif ou ulcéreux (GONÇALVES et al., 2010).

Les lésions vésiculaires blister sont des élévations de l'épithélium, et comme déjà mentionné, contenant du liquide en son sein. La membrane de revêtement peut être mince ou épaisse, selon que la lésion est située sous ou intra-épithéliale, et ne doit pas dépasser 3 mm dans son plus grand diamètre, le reste étant considéré comme une bulle. Les lésions vésiculaires bulleuses fondamentales peuvent se manifester dans les pathologies suivantes (REGEZI; SCIUBBA, 1998):

I) MALADIES VIRALES:

- Infections simples au virus de l'herpès;
- Infections à virus varicelle-zona;
- Maladie des mains, des pieds et de la bouche;
- Herpangine;
- Rougeole (rubéole).

II) CONDITIONS ASSOCIÉES À DES DÉFAUTS IMMUNOLOGIQUES:

- Pemphigus commun;
- Pemphigoïde cicatricielle;
- Pemphigoïde bulleuse;
- Dermatite herpétiforme.

III) MALADIES HÉRÉDITAIRES:

- Épidermolyse bulleuse.

IV) BLESSURES RÉACTIVES (NON INFECTIEUSES):

- Extravasation de mucus;
- Kyste de rétention de mucus;
- Rânula;
- Mucocèle du sinus maxillaire;
- Kyste de rétention du sinus maxillaire et pseudokyste;
- Sialometaplasia nécrosante;
- Pathologie des glandes salivaires induite par le rayonnement;
- Hyperplasie adénomatoïde.

CONCLUSIONS

Il est conclu que la vésicule vésiculeuse peut être le résultat d'une blessure pouvant survenir chez l'homme, en général. Bien connaître l'objet de l'étude, ici la vésicule à bulle, permettrait au dentiste professionnel de bien exercer son métier.

L'examen systématique de la bouche relève de la responsabilité du dentiste. En tant que science et profession de la santé, l'odontologie imprègne les domaines de la prévention et du diagnostic des maladies de la muqueuse humide de la cavité buccale.

Une blessure est un terme utilisé pour décrire un tissu anormal dans un organisme vivant: elle ne peut pas être causée par des maladies sous-jacentes telles que des taches de naissance, des piqûres d'insectes ou des cicatrices, également par des pathologies, des traumatismes, etc.

Les lésions fondamentales de la muqueuse sont des processus pathologiques de base apparaissant cliniquement en raison de modifications morphologiques variées de la peau ou de la muqueuse buccale.

Parmi ceux-ci, la vésicule à bulle a une grande importance dans la qualité de vie et le bien-être de l'être humain, constituant de ce fait un accompagnement important pour les dentistes afin d'élucider les doutes et les désagréments de la cavité buccale, ainsi que la santé bucco-dentaire de l'individu en général

REMERCIEMENTS

Les auteurs remercient le "Centro Universitário Maurício de Nassau", ville de João Pessoa, dans l'État de Paraíba, au nord-est du Brésil (UNINASSAU/PB), pour son soutien institutionnel et scientifique.

RÉFÉRENCES

DANIEL, L.; BANDEIRA, L.B.; BRANDÃO, F.B. Diagnósticos diferenciais de lesão ulcerativa extensa em mucosa oral. In: MOSTRA DE PESQUISA EM CIENCIA E TECNOLOGIA, 2017. **Anais...** Fortaleza: DeVry Brasil - Damásio - Ibmecc, 2019. Disponível em: <https://www.even3.com.br/anais/mpct2017/47400-diagnosticos-diferenciais-de-lesao-ulcerativa-extensa-em-mucosa-oral/>. Acesso em: 31 mar. 2019.

GONÇALVES, L.M.; BEZERRA JUNIOR, J.R.S.; CRUZ, M.C.F.N. Avaliação clínica das lesões orais associadas a doenças dermatológicas. **Anais Brasileiros de Dermatologia**, v. 85, n. 2, p. 150-156, 2010. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/abd/v85n2/04.pdf>. Acesso em: 29 mar. 2019.

REGÉZI, J.Á.; SCIUBBA, J. J. **Patologia Bucal**. Correlações clinicopatológicas. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 1998.

ROEST, M.; VENNING, V.; KHUMALO, N.; KIRTSCHIG, G.; WOJNAROWSKA, G. Cicatricial Pemphigoid (mucousmembrane pemphigoid). **Evidence-base Dermatology**. 2003.

SILVA, L.; LANDMAN, G.; BUSSOLOTI FILHO, I. Lesões vesicobolhosas da mucosa oral. In: CAMPOS, C. A. H.; COSTA, O. O. Editores. **Tratado de otorrinolaringologia**. São Paulo. Roca. p. 390-408. 2002.